

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

しみ、そばかすの緩和に

# システィーホワイトプラス+

## CYSTY WHITE Plus+

ビタミンC主薬製剤  
L-システィン配合

日焼けなどによる色素の沈着を緩和する作用のあるビタミンCに、皮膚の代謝に不可欠なアミノ酸であるL-システィンを加えました。さらに、ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムを配合することによって、その作用をより効果的にしています。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### < 効能・効果 >

次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」

次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## <用法・用量>

次の量を1日3回、朝昼晩服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

### 用法・用量に関連する注意

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## <成分・分量>

1日量（6錠）中

成 分	分 量
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-システイン	240mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	20mg
d- $\alpha$ -トコフェロール（ビタミンE）	20mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg
ニコチン酸アミド	25mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳酸Ca水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ

### 成分・分量に関連する注意

1. ビタミンB<sub>2</sub>は、体内に吸収されその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなる場合があります。
2. ビタミンCは、尿及び大便の検査値に影響を与える場合があります。従って、医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

### 保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 本剤にぬれた手で触れないでください。  
又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

☎0120-419-111

9時～18時(日、祝日を除く)

製造販売元 新日本製薬株式会社  
福岡県福岡市博多区吉塚8-7-11

発 売 元 新日本製薬株式会社 本社  
福岡県福岡市中央区大手門1-4-7