

# 新日本製薬の生薬

販売名：ヨクイニンエキス錠SH

生薬製剤 第3類医薬品



## 相談すること

## ⚠ 使用上の注意

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、腹痛

〈効能・効果〉 いぼ、皮膚のあれ

〈用法・用量〉 右の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
15才未満の小児	服用しないこと	

〈成分・分量〉 成人1日量6錠中に以下の成分を含みます。

ヨクイニンエキス(原生薬換算量15000mg)660mg ヨクイニン末300mg

添加物：含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、カルメロースCa、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ステアリン酸Mg、結晶セルロース

〈成分・分量に関連する注意〉 本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります。又、錠剤の表面に見られる黒褐色の斑点は、ヨクイニンによるものです。

〈保管及び取扱い上の注意〉 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4) 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の袋に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

新日本製薬株式会社  
福岡県福岡市博多区吉塚8-7-11  
発売元

新日本製薬株式会社 本社  
福岡県福岡市中央区大手門1-4-7

おくすり相談室

☎0120-419-111

9:00～17:30(日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

☎0120-149-931